

8. Melyridae, Ptinidae, Mylabridae und Bruchidae

Von

M. Pic.

a) Melyridae.

Zygia viridis F.

Groß-Namaland: Angra Pequena (Lüderitzbucht), Dezember 1903. L. SCHULTZE notiert, daß er diese Art hier „in großer Zahl, aber nur auf den Blüten des *Mesembrianthemum junceum* HAW.“ fand.

Klein-Namaland: Port Nolloth, Juni 1904. „Zu Hunderten in den gelben Blüten der *Othonna floribunda* SCHTR.“

Dasytes schultzei.

Klein-Namaland: Steinkopf, August 1904; Orange-Fluß bei Henkries, August 1904.

b) Ptinidae.

Von den 4 gesammelten Arten sind 2 neu, und es freut mich, eine von diesen dem glücklichen Wanderer, der sie entdeckte, widmen zu können. Die 2 anderen Arten wurden vor kurzem von PÉRINGUEY beschrieben, es sind folgende: *Mezium notiale* PÉRING., bei Port Nolloth, Klein-Namaland (Britisch-Südwestafrika), und *Damarus singularis* PÉRING., bei Cap Cross unweit Swakopmund im Küstengebiet (Deutsch-Südwestafrika) gesammelt.

Ptinus squamulosus n. spec.

Elongatus, opacus, nigropiceus, squamulis griseis dense et omnino vestitus, oculis nigris, magnis; capite grandi, sulcatulo; antennis validis, apice attenuatis; thorace satis brevi, lateraliter sinuato et strangulato, in disco quadridentato; scutello elongato; elytris elongatis, subparallelis, apice attenuatis, paululum striatis; pedibus gracilibus. Deutsch-Südwestfrika.

Allongé, opaque, noir de poix, entièrement et densément revêtu de petites squamules grises, yeux noirs et gros. Tête grande, subsillonnée au milieu du vertex et entre les yeux; antennes insérées près du devant des yeux, dans une profonde fossette (les fossettes antennaires sont séparées l'une de l'autre par une petite carène qui se dilate en forme de triangle antérieurement) atteignant presque le sommet des élytres, robustes à la base, atténués à l'extrémité, premier article épais, 2^e fortement échancré en avant, 3^e épais,

18*

18*

plus court que 4^e, dernier plus long que le précédent. Prothorax assez court, sinué sur les côtés, un peu élargi vers les parties antérieure et postérieure dont les bords sont relevés, orné sur le milieu du disque de quatre dents transversalement disposées, celles-ci non pileuses. Ecusson allongé. Elytres allongés, sub-parallèles, obliquement atténués au sommet, plus larges que le prothorax à la base, faiblement striés, les stries écartées étant cachées par le revêtement écailleux dense, ornés de quelques petites soies blanches peu distinctes. Pattes longues et grêles, squamuleuses. Dessous du corps comme le dessus densément revêtu de squamules grises. Long. 4,5 mm.

Britisch-Südwestafrika: Rooibank im Hinterland der Walfischbai, Mai 1905).

Espèce des plus distinctes dans le genre par son revêtement squamuleux et le prothorax quadridenté.

Pseudomezium schultzei n. spec.

Oblongo-ovatus, nitidus, rufus, elytris pro majore parte nigris ad basin et post medium albido-maculatis; capite ruguloso, oculis minutis, antennis grandibus; thorace singulari, lateraliter dentato piloso, aureo-pubescente, in disco postice sulcato, ante basin transverse impresso aut foveolato et tuberculato (tuberculis plus minusve elevatis, acutis, pilosisque); scutello indistincti; elytris oblongo-ovatis, apice subacuminatis, in disco pro majore parte nigris, longe et sparse pilosis, ad basin albo-notatis, post medium 2 maculis albidis subrotundatis prope suturam sitis ornatis; pedibus satis gracilibus. Britisch-Südwestafrika.

Oblong-ovale, brillant, rougeâtre avec les élytres largement obscurcis sur leur milieu, celles-ci à la base et après le milieu ornés de macules blanches faites de poils épais et rapprochés. Tête longue, ruguleuse, antennes insérées assez loin l'une de l'autre, longues et filiformes, poilues, les articles étant à peu près tous égaux entre eux sauf le dernier qui est distinctement plus long et un peu épaissi. Prothorax particulier, orné d'une pubescence dorée, soit longue et espacée antérieurement, soit courte et condensée dans des fossettes ou sillons postérieurs, pas plus long qu'il est large dans sa partie antérieure qui est bien plus large que la base, fortement et peu densément ponctué, sillonné sur le milieu du disque et impressionné de chaque côté en arrière, impressionné et fossulé transversalement devant la base qui est munie de gibbosités dentées et pileuses plus ou moins saillantes en dessus, celle du milieu (vue de profil) très élevée au-dessus des autres, sur les côtés une sorte de dent pileuse située près du milieu. Ecusson invisible. Elytres en ovale allongé, subacuminés au sommet, noirs sur la majeure partie du disque, longuement rougeâtres à la base, étroitement de cette même coloration à l'extrémité, ornés de macules pileuses blanches disposées sous forme de bande transversale près de la base et sur chacun, près de la suture et après le milieu, d'une petite macule subarrondie de même pubescence; ces organes ont des rangées de points forts, sans stries distinctes, ces rangées éloignées entre elles et hérissées de longs poils clairs espacés. Dessous du corps assez densément revêtu de poils squamuliformes grisâtres. Pattes pileuses, longues, et assez grêles avec les cuisses légèrement épaissies. Long. 2 mm.

Britisch-Südwestafrika, Klein-Namaland: Steinkopf.

Espèce très distincte par la sculpture de son prothorax et ne pouvant être confondue avec *Ps. Cocquereli* FRM., soit par la forme particulière de cet organe, soit par sa coloration.

c) Mylabridae.

Mylabris haemacta FAIRM.

Groß-Namaland: Aar bei Kubub, März 1904; Kubub, März bis April 1904.

Mylabris oculata THUNBG. (= *bifasciata* GAER. sec. VOIGTS).

Klein-Namaland: Steinkopf, August 1904.

Mylabris oculata THUNBG. var. oder spec. nov.

Groß-Namaland: Kubub, März bis April 1904; Namib-Wüste, zwischen Kuikop und Tsirub, April 1904.

Mylabris transversalis MARS. var.?

Damaraland: Okahandja.

Mylabris scalaris MARS.

Damaraland: Okahandja.

Mylabris distincta BERTOL. var.

Damaraland: Okahandja.

Mylabris zigzaga MARS.

Sandfischhafen, südlich von Swakopmund, Oktober 1903 an *Acanthosicyos horrida* WELW.; (über das Gebaren der Tiere s. L. SCHULTZE, Aus Namaland und Kalahari, Jena 1907, S. 148).

Mylabris (Ceroctis) capensis L.

Klein-Namaland: Steinkopf, Juli 1904.

Kapland: Cape Flats, Farm Bergvliet, September 1904.

Mylabris phalerata ER. var.

Kalahari: Kooa, November 1904.

Mylabris.

Damaraland: Okahandja.

Mylabris tincta ER. var.

Damaraland: Okahandja.

Mylabris dentata OLIV.

Damaraland: Okahandja.

Actenodia schultzei n. spec.

Satis brevis et latus, nitidissimus, fere glaber, sparse nigro-hirsutus, niger, elytris testaceis, nigro notatis, antennis testaceis, articulis 2 basalibus nigris exceptis; capite thoraceque crebre sat sparse punctatis; antennis brevibus; elytris testaceis, nigro-notatis, ante et post medium fasciatis (fascia prima interrupta) postice et apice nigro-maculatis. Africa australis.

Assez court et large, très brillant, presque glabre, orné de poils foncés courts, redressés, ceux-ci espacés sur les élytres qui sont testacés, maculés et fasciés de noir, antennes testacées avec les 2 articles de la base noirs, le reste du corps noir avec les tibias vaguement roussâtres. Tête et prothorax noirs, à ponctuation profonde mais assez espacée, la première large, le second assez court, un peu impressionné sur le disque en arrière. Antennes courtes, testacées à 2 premiers articles noirs, premier allongé, dernier très dilaté en dessous. Elytres plus larges que le prothorax, un peu rétrécis au sommet, assez finement et irrégulièrement ponctués, testacés, ornés des dessins noirs suivants: avant le milieu une fascie interrompue faite d'une grande macule suturale et de petites macules discales, après le milieu une fascie sinuée n'atteignant pas le bord externe, avant le sommet une petite macule discale subarrondie et au sommet une macule transversale élargie latéralement; suture à la base et au sommet étroitement foncée, base près de

l'écusson également foncée. Dessous du corps noir. Pattes noires avec les tibias vaguement roussâtres. Long. 11 mm.

Betschuanaland-Protektorat: Kalahari, Lehututu-Kang, Januar 1905.

Diffère de *chrysomelina* ER. par le dessin des élytres et, sans doute aussi, par les antennes; pourrait être une variété de l'espèce d'ERIKSON.

d) Bruchidae.

Spermophagus natalensis FÄHR. var.

Kalahari: Sekgoma-Khakhea, November 1904.

Bruchus.

Groß-Namaland.

Aus dem Innern der Schotenfrüchte der *Acacia hebeclada* DC.
